beaphar

Medicinale halsband

Hét bewezen alternatief

- Doodt en weert teken gedurende **8 maanden**
- Doodt vlooien tot **6 maanden**
- Vermindert het risico op leishmaniose door zandvliegen gedurende **8 maanden**



Beaphar Medicinale halsband

Beaphar Medicinale halsband sluit aan op de wens van de consument

Inzicht in de belangrijkste aankoopcriteria die de huisdierbezitter beïnvloeden, is essentieel om de waarde van medicinale halsbanden uit te leggen aan de klant.

Belangrijkste aankoopcriteria		Beaphar Medicinale halsband
		
Premium kwaliteit	✓	**Bewezen bescherming** Werkzaamheid aangetoond in 12 klinische studies
Gebruiksgemak	✓	**Langdurige werking** 1 halsband beschermt tot 8 maanden
Prijs	✓	**Vriendelijk geprijsd** Lage kosten per maand

Voorziet in een duidelijke behoefte bij de consument

Huisdierbezitters zoeken naar een optimale, maar ook betaalbare bescherming. Beaphar Medicinale halsband vult het gat tussen budgetmerken (beperkt werkzaam) en Seresto, door premium bescherming te bieden tegen een toegankelijke prijs.

Laat de prijsbewuste koper niet lopen

Het opnemen van Beaphar Medicinale halsband in het assortiment is een slimme, klantgerichte beslissing. Door het aanbieden van een bewezen alternatief voor Seresto kunnen klanten, die dreigen af te haken op de hoge prijsstelling van dit merk, behouden blijven.

Beaphar Medicinale halsband maakt het assortiment anti-parasitaire banden compleet. Het bevordert klantenbinding en zorgt ervoor dat iedere klant dé betrouwbare bescherming vindt, waar behoefte aan is, in hun vertrouwde speciaalzaak.



2 VAN DE 5 HUISDIERBEZITTERS **IS BEREID** VAN MERK TE **WISSELEN** VOOR EEN **BETERE PRIJS**[1]

[1] Beaphar UK dog and cat owner survey, 2022 (N=1,003). Percentage of respondents identifying price as a key driver for brand switching (equivalent to 2 in 5 respondents)]

Bewezen bescherming

Beaphar Medicinale halsband

Beaphar Medicinale halsband voor honden en katten, is samengesteld met imidacloprid en flumethrine en zorgt per band tot 8 maanden lang voor een continue bescherming tegen parasieten.



- Doodt en weert teken gedurende **8 maanden**
- Doodt vlooien tot **6 maanden**
- Vermindert het risico op leishmaniose door zandvliegen gedurende **8 maanden**

Werkzaamheid aangetoond in 12 klinische studies

De werkzaamheid van Beaphar Medicinale halsband wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. De effectiviteit tegen teken, vlooien en zandvliegen is bewezen in 12 onderzoeken die voldoen aan alle GCP (Good Clinical Practice) richtlijnen.

Deze studies, uitgevoerd in lijn met de strengste internationale kwaliteitsstandaarden, bieden een solide wetenschappelijke basis waarop vertrouwd kan worden in gesprekken met de klant.

Het generieke alternatief voor Seresto

Beaphar Medicinale halsband is een geregistreerd generiek alternatief voor Seresto. Het bevat dezelfde werkzame stoffen in dezelfde hoeveelheden. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat Beaphar Medicinale halsband een betrouwbaar alternatief is, met een vergelijkbare werking en veiligheid als Seresto. Beaphar Medicinale halsband is een geregistreerd diergeneesmiddel in 20 Europese landen.

Kenmerk	Beaphar Medicinale halsband	Seresto
Werkzame bestanddelen	✓ Imidacloprid en flumethrine	Imidacloprid en flumethrine
Gehalte	✓ 10% w/w imidacloprid, 4.5% w/w flumethrine	10% w/w imidacloprid, 4.5% w/w flumethrine
Vrijgave werkzame bestanddelen	✓ Overeenkomstig [2,3]	Referentieproduct
Werkzaamheid	✓ Overeenkomstig [2,3]	Referentieproduct
Veiligheid	✓ Overeenkomstig [2,3]	Referentieproduct


[2] Clinvet, 2023/2024. 001003 - In vivo release of Flumethrin and Imidacloprid from Flumi and Seresto collars on 10 dogs.
[3] ACRO Veterinary Laboratories, 2024. 001008 - In vivo release Flumethrin and Imidacloprid from Flumi and Seresto collars on 10 cats.

Langdurige bescherming

Werkzaamheid tegen teken bij honden

Teken - *Ixodes ricinus*

Wetenschappelijk onderzoek bij honden bevestigt dat Beaphar Medicinale halsband een snelle en langdurige dodende en werende werking heeft tegen Ixodes ricinus gedurende **8 maanden**.




[4] ACRO Veterinary Laboratories, 2023. 001004 - Efficacy testing of Flumethrin/Imidacloprid collar against ticks *Ixodes ricinus* on dogs (dose confirmation study). Study included 16 dogs: 8 dogs with Flumethrin/Imidacloprid collar, 8 dogs with placebo collar.
[5] ACRO Veterinary Laboratories, 2025. 001124 - Repellent efficacy testing of Flumethrin/Imidacloprid collar against ticks *Ixodes ricinus* on dogs. Study included 14 dogs: 7 dogs with Flumethrin/Imidacloprid collar, 7 dogs with placebo collar.




Teken - *Rhipicephalus sanguineus*

Wetenschappelijk onderzoek bij honden bevestigt dat Beaphar Medicinale halsband een snelle en langdurige dodende en werende werking heeft tegen Rhipicephalus sanguineus gedurende **8 maanden**.



Teken - *Dermacentor reticulatus*

Wetenschappelijk onderzoek bij honden bevestigt dat Beaphar Medicinale halsband een snelle en langdurige dodende werking heeft tegen Dermacentor reticulatus gedurende **8 maanden**.




[6] ACRO Veterinary Laboratories, 2024. 001106 - Efficacy testing of Flumethrin/Imidacloprid collar against fleas *Ctenocephalides felis* and ticks *Rhipicephalus sanguineus* on dogs (dose confirmation study). Study included 16 dogs: 8 dogs with Flumethrin/Imidacloprid collar, 8 dogs with placebo collar.
[7] ACRO Veterinary Laboratories, 2025. 001126 - Repellent efficacy testing of Flumethrin/Imidacloprid collar against ticks *Rhipicephalus sanguineus* on dogs. Study included 14 dogs: 7 dogs with Flumethrin/Imidacloprid collar, 7 dogs with placebo collar.
[8] ACRO Veterinary Laboratories, 2023. 001011 - Efficacy testing of Flumethrin/Imidacloprid collar against ticks *Dermacentor reticulatus* on dogs (dose confirmation study). Study included 16 dogs: 8 dogs with Flumethrin/Imidacloprid collar, 8 dogs with placebo collar.

Langdurige bescherming

Werkzaamheid tegen teken bij katten

Teken - *Ixodes ricinus*

Wetenschappelijk onderzoek bij katten bevestigt dat Beaphar Medicinale halsband een snelle en langdurige dodende en werende werking heeft tegen Ixodes ricinus gedurende **8 maanden**.




[9] ACRO Veterinary Laboratories, 2023. 000997 - Efficacy testing of Flumethrin/Imidacloprid collar against ticks *Ixodes ricinus* on cats (dose confirmation study). Study included 16 cats: 8 cats with Flumethrin/Imidacloprid collar, 8 cats with placebo collar.
[10] ACRO Veterinary Laboratories, 2025. 001125 - Repellent efficacy testing of Flumethrin/Imidacloprid collar against ticks *Ixodes ricinus* on cats. Study included 16 cats: 8 cats with Flumethrin/Imidacloprid collar, 8 cats with placebo collar.



Dodende werking tegen vlooien bij honden en katten

Vlooien - *Ctenocephalides felis*


Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat Beaphar Medicinale halsband een snelle en langdurige dodende werking heeft tegen vlooien (Ctenocephalides felis) **gedurende 6 maanden bij honden en 5,5 maanden bij katten**.



Vermindering van het risico op leishmaniose bij honden

Zandvliegen - *Phlebotomus perniciosus*

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat Beaphar Medicinale halsband het risico op leishmaniose bij honden door zandvliegen vermindert gedurende **8 maanden**. In een veldstudie in Griekenland kreeg één groep honden de (Medicinale halsband) band om bij aanvang van het onderzoek, terwijl de andere groep geen band had. Na 11 maanden was 30% van de honden uit de groep zonder band besmet met Leishmania infantum, vergeleken met 0% van de honden die de band droegen.



[6] ACRO Veterinary Laboratories, 2024. 001106 - Efficacy testing of Flumethrin/Imidacloprid collar against fleas *Ctenocephalides felis* and ticks *Rhipicephalus sanguineus* on dogs (dose confirmation study). Study included 16 dogs: 8 dogs with Flumethrin/Imidacloprid collar, 8 dogs with placebo collar.
[11] ACRO Veterinary Laboratories, 2023. 001006/2 - Efficacy testing of Flumethrin/Imidacloprid collar against *C. felis* on cats (dose confirmation study). Study included 16 cats: 8 cats with Flumethrin/Imidacloprid collar, 8 cats with placebo collar.
[12] Clinglobal, 2023. 00974 - Blocking efficacy of IMI-FLU-GEN-collar in preventing Leishmaniosis caused by *Leishmania infantum* infection in dogs in Greece under field conditions. Study included 60 dogs: 30 dogs with Flumethrin/Imidacloprid collar, 30 dogs without a collar.

Dubbele werking: imidacloprid en flumethrine

Beaphar Medicinale halsband combineert deze twee betrouwbare werkzame stoffen in een verfijnde polymeer-matrix.
Dit materiaal fungeert als een reservoir dat zorgt voor een continue en gelijkmatige vrijgave van de werkzame stoffen gedurende **8 maanden**.



Imidacloprid
Doodt vlooien

Wanneer vlooien in contact komen met imidacloprid, wordt hun centrale zenuwstelsel aangetast door een verstoring van de overdracht van zenuwimpulsen. Dit leidt tot verlamming, waardoor vlooien binnen 3–5 minuten stoppen met eten en vervolgens binnen 20 minuten sterven. Continue bescherming doorbreekt de levenscyclus van de vlo, door ze te doden voordat ze eitjes kunnen leggen.

Flumethrine
Doodt en weert teken

Wanneer teken in contact komen met **flumethrine**, raakt hun zenuwstelsel overprikkeld, wat leidt tot verlamming en de dood. Daarnaast zorgt flumethrine voor een afwerend ‘hot-foot’-effect, waardoor teken zich niet hechten en het dier verlaten voordat ze kunnen bijten. Dit helpt het risico op overdracht van ziekten te verminderen.

Terwijl imidacloprid zich richt op vlooien, biedt de toevoeging van flumethrine bescherming tegen teken en vermindert het het risico op leishmaniose bij honden, een ziekte die wordt overgedragen door zandvliegen.

Continue vrijgave, constante bescherming

In tegenstelling tot orale behandelingen (tabletten) werkt Beaphar Medicinale halsband op het huidoppervlak. Imidacloprid en flumethrine worden geleidelijk vrijgegeven vanuit de polymeer-matrix van de halsband naar de natuurlijke vetlaag van de huid.


Deze werkzame stoffen **verspreiden zich binnen korte tijd over het lichaamsoppervlak** en vormen een onzichtbaar ‘schild’. Dit zorgt ervoor dat parasieten door contact worden gedood of geweerd, voordat ze de kans krijgen te bijten.




1. **De werkzame stoffen in de halsband**
   Imidacloprid en flumethrine zijn opgeslagen in de halsband.
2. **Continue afgifte**
   Kleine hoeveelheden van de werkzame stoffen worden geleidelijk afgegeven aan de huid en vacht van het huisdier.
3. **Verspreiding van de werkzame stoffen**
   De werkzame stoffen verspreiden zich over het lichaam via de natuurlijke vetlaag van de huid.
4. **Continue bescherming**
   Teken worden geweerd en gedood voordat ze bijten en vlooien worden razendsnel geëlimineerd.

Gebruiksaanwijzing Beaphar Medicinale halsband

Honden tot 8 kg
Lengte aanpasbaar
tot 38 cm



Honden vanaf 8 kg
Lengte aanpasbaar
tot 70 cm



Katten
Lengte aanpasbaar
tot 38 cm



Veiligheidsmechanisme

Alle halsbanden zijn voorzien van een veiligheidsmechanisme in de gesp, zodat bij extreme druk de band door de gesp kan schuiven. De kleine halsbanden voor honden en katten hebben bovendien een extra zigzagvormige veiligheidszone die onder spanning breder wordt of scheurt, zodat het huisdier zichzelf veilig kan bevrijden als de halsband ergens achter blijft haken.



Verschillen tussen Beaphar Medicinale halsband en Canishield®





WERKING		WERKING
8 maanden	Teken	**6 maanden**
Doodt en weert: *Ixodes ricinus* *Dermacentor reticulatus** *Rhipicephalus sanguineus** *bij honden		**Doodt en weert:** *Ixodes ricinus*
Tot 6 maanden	Vlooien	**4 maanden**
Doodt: Ctenocephalides felis		**Doodt:** Ctenocephalides felis
10-12 weken*	Vlooienlarven	**X**
Beschermt tegen: ontwikkeling vlooienlarven *varieert per bij hond / kat		
8 maanden	Zandvliegen	**6 maanden**
Vermindert het risico op leishmaniose door zandvliegen bij honden.		Vermindert het risico op leishmaniose door zandvliegen bij honden.
EIGENSCHAPPEN		**EIGENSCHAPPEN**
Honden en katten	Doeldier	**Honden**
Geschikt voor honden vanaf 7 weken en katten vanaf 10 weken leeftijd		Geschikt voor honden vanaf 7 weken leeftijd
Niet gebruiken tijdens dracht of lactatie	Dracht & Lactatie	Uitsluitend in overleg dierenarts
Imidacloprid + flumethrine	Werkzame bestanddelen	**Deltamethrine**
Doodt en weert vanaf 2-16 dagen* *afhankelijk van parasietensoort	Start werking	**Volledige werking na 7 dagen**
✓	Waterbestendig	X
✓	Geurloos	✓
✓	Verstelbaar	✓
✓	Veiligheids-mechanisme	X

Eén halsband, tot 8 maanden bescherming tegen teken en vlooien.

Eén halsband, vele maanden gemak.
Beaphar Medicinale halsband, doodt en weert teken gedurende 8 maanden en doodt vlooien tot 6 maanden. Daarnaast vermindert Beaphar Medicinale halsband het risico op leishmaniose door zandvliegen bij honden over een periode van 8 maanden. Bewezen en zekere bescherming tegen een eerlijke prijs.



beaphar®

Because pets are family too

beaphar.com